

先生各位

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
このたび下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させて頂きたくご案内申し上げます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。
また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。 謹白

記

● 変更実施日 2010年12月13日（月）受付分より

● 変更内容

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	新	現行	備考
16	2351	凝固因子 第2因子	所要日数	3～5日	3～9日	所要日数の短縮
16	2352	凝固因子 第5因子	所要日数	3～5日	3～9日	
16	2353	凝固因子 第7因子	所要日数	3～5日	3～9日	
16	2355	凝固因子 第9因子	所要日数	3～5日	3～7日	
16	2356	凝固因子 第10因子	所要日数	3～5日	3～9日	
16	2357	凝固因子 第11因子	所要日数	3～5日	3～9日	
16	2364	凝固因子 第12因子	所要日数	3～5日	3～9日	
42	5387	キニジン	所要日数	3～9日	5～11日	
41	5236	ブロムペリドール	採血時刻	随時（ただし採血時刻を一定とする。）	なし	採血時刻を見直し、より詳細に、より新しい情報に変更させていただきます。
42	5388	リドカイン	採血時刻	静注：投与後2時間 点滴静注：6～12時間	随時	
42	5238	フレカイニド	採血時刻	次回投与直前 (Trough濃度)	随時	
43	1116	アプリンジン	採血時刻	経口：次回投与直前 (Trough濃度)、投与後2～4時間 (Peak濃度) 静注：次回投与直前 (Trough濃度)	なし	
43	4603	アミオダロン	採血時刻	次回投与直前 (Trough濃度)	随時	
43	2579	ゲンタマイシン	検査方法	E I A	F P I A	現試薬販売中止による測定試薬変更。
			基準値	Peak 4.0～10.0 Trough 2.0以下 (μ g/mL)	Peak 4～10 Trough 2以下 (μ g/mL)	
			検体量	血清 0.4 mL	血清 0.2 mL	
			採血時刻	筋注後15～60分 点滴静注終了後 (Peak濃度) 次回投与直前 (Trough濃度)	点滴静注後30分以内 筋注後1時間 (Peak濃度) 次回投与直前 (Trough濃度)	
15	2361	血小板第4因子 (PF4)	欄外の注意事項	1時間以内に必ず冷却 下で遠心分離する。	3時間以内に必ず冷却 下で遠心分離する。	容器の仕様の変更の為
15	5359	β -トロンボグロブリン (β -TG)				