

先生各位

検査内容変更と中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
 このたび下記の検査項目につきまして、検査内容変更と中止をさせて頂きたくご案内申し上げます。
 先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。
 また、今後とも宜しくご厚誼の程、お願い申し上げます。

謹白

記

● 変更実施日 2016年5月30日（月）受付分より

● 変更内容

| 案内書掲載頁 | 項目コード | 項目名称 | 変更箇所 | 新 | 現 | 変更理由 |
|--------|-------|--------------------------|------|--|--|---------------------------|
| 33 | 2406 | ケトン体分画定量 ＜静脈血＞ | 検体量 | 血清 0.3mL | 血清 0.5mL | 検査方法見直しに伴う基準値と所要日数、検体量の変更 |
| | | | 所要日数 | 3～4日 | 1～2日 | |
| | | | 検査方法 | 酵素法 | ジアラブカップリング法 (比色法) | |
| | | | 基準値 | 総ケトン体：26.0～122 アセト酢酸：13.0～69.0 3-ヒドロキシ酪酸：76.0以下 ($\mu\text{mol/L}$) | 総ケトン体：26～122 アセト酢酸：13～69 3-ヒドロキシ酪酸：76以下 ($\mu\text{mol/L}$) | |
| 未掲載 | 1106 | 動脈血ケトン体分画 定量 ＜動脈血＞ | 検体量 | 血清 0.3mL | 血清 0.5mL | |
| | | | 所要日数 | 3～4日 | 1～2日 | |
| | | | 検査方法 | 酵素法 | ジアラブカップリング法 (比色法) | |
| | | | 基準値 | ケトン体比（アセト酢酸／ 3-ヒドロキシ酪酸比）： 0.70以上 (総ケトン体の報告については中止とさせていただきます。) | 未設定 | |

● 検査受託中止項目

| 案内書掲載頁 | 項目コード | 項目名称 | 中止理由 | 代替項目 |
|--------|-------|---------------|-------------|----------------------|
| 33 | 1060 | ケトン体(アセトン体)定量 | 検査試薬販売中止のため | 上記のケトン体分画定量 ＜静脈血＞ |
| 未掲載 | 5226 | 尿ケトン体定量 | | 代替項目なし |